

BIOSEGURIDAD

MÁXIMA

*Consejos y recomendaciones
para prevenir la entrada de enfermedades
infecciosas en una explotación de cebo de terneros*



La entrada constante de animales en un cebadero de terneros multiplica los posibles riesgos que puedan registrarse en una explotación, por lo que es imprescindible poner en marcha un adecuado programa de bioseguridad, que consiste no sólo en evitar que entren patologías infecciosas en la granja, sino que las ya existentes no se transmitan de forma rápida entre los animales.

CONCEPTOS BÁSICOS

1. **'Todo dentro-todo fuera'.** Es el conocido sistema de manejo por el que se evita mezclar lotes diferentes de animales. De este modo se evita la transmisión de patologías.
2. **Limpieza.** Extremar la limpieza en todas las zonas de la explotación.
3. **Desinfección.** Complementa la limpieza.



Fuente: Provacuno



Fuente: 3tres3



Fuente: AgriExpo



DEPÓSITO PARA
MEDICACIÓN
AISLADA

Fuente: VISAVET-Pablo del Carmen

MEDIDAS

- Buen aislamiento exterior. Vallado que evite la entrada de fauna salvaje y de animales domésticos.
- Control y registro de las visitas. Uso obligatorio mínimo de calzas para las personas que entren fuera de la explotación. También se deben reducir las visitas al mínimo posible.
- Muelles de carga y descarga que eviten la entrada de camiones y otros vehículos a la explotación.
- Formación del personal que trabaja en la explotación. Zona de vestuario para que entren en la granja únicamente con la ropa de trabajo.
- Control sanitario en origen de los animales. Esta medida exige la colaboración con las explotaciones de vacas nodrizas.
- Examen previo de los terneros.
- Aplicación de medidas de bioseguridad en el transporte.
- Puesta en marcha de un lazareto. Establecer cuarentenas eficaces en las explotaciones.
- Protocolo de higiene en instrumentos y utensilios.
- Mantenimiento de las calificaciones sanitarias.
- Programa de vacunación y desparasitación.
- Buen manejo de las camas.
- Control de la ventilación para asegurar una correcta temperatura y humedad en el ambiente.
- Programa de desratización.
- Uso de insecticidas para el control de insectos, que actúan frecuentemente como vectores de enfermedades.
- Evitar la entrada de pájaros en la granja.
- Separaciones sólidas entre corrales para evitar que se mezclen terneros de diferentes lotes.
- Reducir el tamaño de los lotes para facilitar su vigilancia.
- Control y limpieza de los silos.
- Control de potabilidad del agua.
- Bebederos independientes para evitar el contacto directo entre animales.
- Cumplimiento estricto de la normativa sobre medicamentos y utilización según la receta veterinaria.
- Plan de recogida de envases de medicamentos.
- Control de documentos.
- Protocolos de limpieza y desinfección.
- Medidas eficaces de vacío sanitario.