

DECÁLOGO DE BIOSEGURIDAD FREnte A DERMATOSIS NODULAR CONTAGIOSA

GRANJAS DE VACUNO DE CARNE – AGRO&AL
OCTUBRE 2025

Fuente: www.mapa.gob.es




CONTROL ESTRICTO DE MOVIMIENTOS

No introducir animales sin conocer su origen sanitario. Exigir certificados actualizados y evitar entradas desde zonas en restricción o de riesgo. Cuarentena mínima de 21 días para todo animal nuevo o retornado.



DESINSECTACIÓN SISTEMÁTICA

Aplicar insecticidas y repelentes en animales, instalaciones y vehículos. Controlar especialmente moscas, mosquitos y tábanos. Repetir ratamientos con frecuencia durante los meses cálidos.



GESTIÓN DEL ESTIÉRCOL Y ZONAS HÚMEDAS

Evitar acumulaciones que sirvan de foco para insectos. Mantener drenajes y evitar charcas o puntos de agua estancada. Cubrir o remover periódicamente el estiércol.



LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RIGUROSA

Lavar con agua a presión y desinfectar corrales, vehículos, básculas y mangas tras cada uso con animales externos. Usar desinfectantes virucidas autorizados.




CONTROL DE VEHÍCULOS Y VISITAS

Registrar toda entrada a la explotación. Exigir limpieza previa de ruedas, suelas y material antes de entrar. Restringir el acceso a lo estrictamente necesario.

DECÁLOGO DE BIOSEGURIDAD FREnte A DERMATOSIS NODULAR CONTAGIOSA

GRANJAS DE VACUNO DE CARNE – AGRO&AL
OCTUBRE 2025

Fuente: www.mapa.gob.es



ROPA Y UTENSILIOS EXCLUSIVOS

Cada explotación debe disponer de ropa, botas y material de trabajo propio. Evitar el intercambio de material entre granjas.



VIGILANCIA CLÍNICA DIARIA

Formar al personal para detectar fiebre, apatía, anorexia o lesiones nodulares en piel. Ante sospecha: aislar el animal y avisar inmediatamente al veterinario responsable o SVO.



CONTROL DE CADÁVERES Y RESTOS ORGÁNICOS

Eliminar rápidamente los animales muertos o costras secas mediante empresa autorizada (SANDACH). El virus puede mantenerse viable durante meses.



MINIMIZAR ESTRÉS Y MOVIMIENTOS INNECESARIOS

Evitar traslados, ferias o concentraciones si hay riesgo epidemiológico. El estrés favorece la diseminación y agrava los signos clínicos.



COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN

Mantener una comunicación fluida con el veterinario de la explotación y la ADS o cooperativa. Actualizar protocolos según las indicaciones del MAPA y de la CCAA.

AGRO&AL: COMPROMETIDOS CON LA SANIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD GANADERA